

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 12-7-67 672135

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

(AUDE, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

25 francs

N° 82 - JUILLET 1967/24

I^o supplément

TORDEUSE ORIENTALE

Il est nécessaire de commencer (I^o traitement) d'assurer la protection des fruits qui seront récoltés entre le 10 et le 25 août. Pour les fruits dont on prévoit la récolte pour les derniers jours d'août, réaliser le premier traitement entre le 17 et le 22 juillet. Sur poires et pommes utiliser un insecticide assurant également la prévention des dégâts du Carpocapse.

TEIGNE DE L'OLIVIER

Exécuter d'urgence le deuxième traitement préconisé par notre bulletin n° 81 2^o supplément. Nous signalons aux agriculteurs qu'à ce jour (10 juillet) aucune capture de Dacus (Mouche de l'olive) n'a été enregistrée en Languedoc Roussillon, ou à proximité.

L.L. TROUILLON

POMMIER - RAPPEL DE TRAITEMENTS

La première génération de Carpocapse a causé quelques dommages dans les vergers n'ayant pas reçu les traitements préconisés.

La deuxième génération se manifesterait avant la fin Juillet. Les traitements dirigés contre ce ravageur ne doivent pas être relâchés.

Depuis les premières observations, les dégâts de Zeuzère se sont intensifiés : se rapporter à notre précédent bulletin.

Quelques taches de tavelure (notamment sur fruits) sont observées ici et là (Gard, Lozère, Hérault). Dans de telles situations ajouter un fongicide à la bouillie insecticide.

POIRIER - RAPPEL DE TRAITEMENTS

La climatologie est favorable au développement du Psylle. Ce ravageur est très actif. Effectuer un traitement en respectant les délais d'emploi des pesticides.

M. BEZUT

7267

CULTURES LÉGUMIÈRES

AVERTISSEMENTS

TOMATES

Mildiou : malgré quelques orages locaux en début de mois la situation générale n'a pas évolué ; le temps reste défavorable à l'évolution de la maladie. Les traitements dirigés contre le Mildiou ne sont donc pas justifiés pour le moment.

Alternaria : La situation reste également stationnaire en ce qui concerne cette maladie. Les cultures doivent être surveillées à la suite des orages localisés du début du mois dans les secteurs où la maladie aurait pu faire son apparition courant Juin.

INFORMATIONS

Acariens sur aubergines

Quelques attaques d'acariens ont été observées ces derniers temps. Pour combattre ces parasites utiliser un des produits suivants :

Homologation : Parathion éthyl 25 g
Parathion méthyl : 30 g
Diazinon : 25 g
Diethion : 100 g
Malathion : 75 g
Mévinphos : 35 g
Azinphos : 40 g
Carbophénouthion : 45 g
Prothoate : 30 g
Dicofol : 50 g
Chlorfenizon : 50 g
Chlorbenside : 50 g
Fenizon : 50 g
Tétradifon : 25 g
Thioquinox : 40 g
Chlorobenzilate : 25 g
Binapacryl : 50 g

Autorisation provisoire de vente :

Chloropropylate, Diméthoate, Endothion,
Phenkapton, Phosalone, Tétrasil.

Médathion, Naled

Mildiou du melon

Dans les cultures où des attaques ont été observées poursuivre les traitements en se référant à la note n° 79 - 4° supplément d'Avril 1967.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :
P. BERVILLE

P. CHRESTIAN,

Imprimerie de la Station du Languedoc Roussillon - Le Directeur Gérant : L. BOUYX